

بررسی میزان شیوع افسردگی اساسی در پرسنل پایور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مراجعه کننده به بیمارستان ۵۰۶ در تاریخ ۱۰/۸/۸۱ لغایت ۱۰/۱۱/۸۱

دکتر سیدمجتبی جعفری نژاد

سابقه و هدف

افسردگی از شایعترین بیماریهای روانپزشکی است که شیوع بسیار بالای آن خصوصاً در پرسنل ارتش گزارش شده است. با توجه به شیوع بالای آن و عوارضی همچون یأس و ناامیدی از زندگی، نارضایتی، افکار انتحاری، بلاتصمیمی و نیاز به شناخت وضعیت این بیماری در پرسنل پایور نیروی زمینی مراجعه کننده به بیمارستان ۵۰۶ این تحقیق در پاییز و زمستان ۱۳۸۱ انجام گرفت.

مواد و روشها

تحقیق به روش توصیفی در ۲۰۰ نفر پرسنل پایور نیروی زمینی با روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. با استفاده از تست تشخیصی Beck و مصاحبه بالینی از بیماران انجام یافت.

یافتهها

در کل تعداد ۳۰۰ پرسشنامه بین پرسنل پایور مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان ۵۰۶ توزیع شد که از این تعداد ۲۰۰ پرسشنامه جهت تحلیل بازگردانده شد که به این ترتیب میزان پاسخ گویی ۶۶/۶ را نشان می دهد. میانگین سنی در پرسنل مبتلا به افسردگی ۲۸/۲۹ سال با انحراف معیار ۷/۲ سال به دست آمد. میزان تأهل ۸۲/۵ درصد که ۸/۵ درصد مجرد، ۸/۵ درصد مطلقه و ۰/۵ درصد بیوه بودند. وضعیت تحصیلی افراد مورد تحقیق ۳۶/۵ درصد دیپلم یا فوق دیپلم بودند، ۳۱ درصد تحصیلات راهنمایی یا دبیرستان داشتند و ۶/۵ درصد مدرک لیسانس یا بالاتر و ۶ درصد تحصیلات ابتدایی داشته اند. از این میان پاسخ دهندگان ۸۹ درصد دچار درجاتی از افسردگی بوده اند که نسبت به تحقیقات انجام شده در آمریکا (۱۵-۱۰ درصد) افزایش زیادی دارد. از این تعداد ۲۳ درصد افسردگی mild، ۲۳ درصد