

آرتریت سپتیک نتیجه التهاب عفونی مفصل است و شایع ترین پاتوژن آن انتشار میکروارگاناسم به مفصل متعاقب باکتری می است و سایر روشهای ایجاد آن شامل انتقال مستقیم جرم به دنبال ترومای نافذ و انتشار مجاورتی و عفونت متعاقب عمل جراحی می باشد. عفونت باکتریال جدی ترین نوع آرتریت است و هر مفصلی اعم از سالم یا آسیب دیده می تواند دچار آرتریت سپتیک شود.

مرگ و میر ناشی از آرتریت سپتیک از ۱۰٪ تا ۵۰٪ متغیر است.

بهبودی کامل در آرتریت سپتیک امکان پذیر است و لیکن در بیمارانی که بیماری زمینه ای مفصلی بویژه آرتریت روماتوئید دارند پروگنوز ضعیف است.

هدف:

بررسی توصیفی آرتریت سپتیک در مراجعین به بیمارستانهای ۵۰۱ و بعثت نیروی

هوایی و گلستان نیروی دریائی در طی سالهای ۸۱-۸۰

روش تحقیق:

روش مطالعه در این تحقیق به شیوه مطالعه توصیفی گذشته نگر بوده و در این تحقیق

۸۰ بیمار آرتریت مراجعه کننده به بیمارستانهای مذکور مورد مطالعه قرار گرفت که ۳۰

مورد از آنها به خاطر ناقص بودن پرونده و نداشتن تشخیص قطعی از دور مطالعه کنار