

BACKGROUND (مقدمه) :

ریفلاکس معده به مری یکی از شایعترین بیماریهای دستگاه گوارش است که با علائم سوزش سردل - رگورژیتاسیون - بلع دردناک ، اشکال در بلع مشخص می شود .

AIM (هدف) :

بررسی علائم آندوسکوپی ریفلاکس معده به مری در بیماران مراجعه کننده با علائم ریفلاکس به بیمارستان گلستان سال ۱۳۸۱ .

METHOD (روش) :

این مطالعه از نوع توصیفی - مشاهده ای و گذشته نگر می باشد . بر این اساس ۱۰۰ بیمار مبتلا به ریفلاکس معده به مری که مراجعه به درمانگاه گوارش بیمارستان گلستان نیروی دریایی در یک دوره زمانی ۳ ماهه اول سال ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفته ، از تمامی بیماران با علائم ریفلاکس آندوسکوپی به عمل آمده و نتیجه مشاهدات آندوسکوپی درج گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند .

FINDINGS (یافته ها) :

از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه ۵۲ مورد مری طبیعی ، ۱۷ مورد ازوفازیت ، ۱۳ مورد هرنی هیاتال ، ۸ مورد ازوفازیت و هرنی هیاتال ، ۲ مورد واریس مری ، ۱ مورد ازوفایت عفونی ، ۱ مورد ازوفازیت وابسته به رادیوتراپی سر و گردن ، ۱ مورد مری بارت و هرنی هیاتال ، ۲ مورد مری بارت ، ۲ مورد آشالازی ، ۱ مورد اولسر مری با تشخیص SCC

CONCLUSION (نتیجه گیری) :

با توجه به اینکه حدود نیمی از افرادی که با علائم GERD مراجعه کردند علائم درگیری مخاط مری داشتند لزوم بررسی سریعتر و درمان زودهنگام و صحیح مبتلایان به GERD توصیه می شود .