

زمینه:

ITP پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک بیماری نسبتاً نادری است که میزان شیوع آن به درستی در جهان شناخته شده نیست و همچنین علل مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند اما با توجه به اینکه یک علت شایع اختلال خونریزی دهنده می‌باشد و در سنین مختلف علت آن نیز متفاوت می‌باشد، در نتیجه درمان بموقع آن و نوع درمان لازم، ضروری می‌باشد.

هدف:

بررسی میزان پاسخ به درمان‌های مختلف در بیماران مبتلا به ITP مراجعه‌کننده به بخش خون بیمارستان ۵۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۱.

روش کار:

مطالعه به صورت توصیفی مقطعی است و مطالعه به صورت گذشته‌نگر بر روی پرونده‌های موجود در بایگانی بیمارستان ۵۰۱ که بدلیل بیماری ITP بستری شده‌اند انجام می‌گیرد.

پارامترهای مورد بررسی شامل: سن - جنس - نوع درمان (پردنیزولون - دگزامتازون

- IVIG - سیکلوسپورین - طحال برداری) می‌باشد. \*

یافته‌ها و نتایج:

شایع‌ترین سن بروز این بیماری زیر چهل سال بوده است که میانگین سنی کل ۳۹/۷