

## چکیده:

زمینه: افسردگی شایعترین بیماری روانی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونر تأثیر می‌گذارد، بنابراین تشخیص و درمان افسردگی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر می‌تواند باعث بهتر شدن پیش‌آگهی و کاهش مرگ و میر شود.

هدف: تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در بخش سی‌سی‌یو بیمارستان بعثت در سه ماهه‌ی اول سال ۱۳۸۲ می‌باشد.

روش کار: روش مطالعه به صورت توالی موارد و نمونه‌گیری به صورت متوالی بود و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد بک جمع‌آوری شد.

یافته‌ها و نتایج: در مطالعه‌ی ما ۶۱/۹ درصد بیماران دچار افسردگی بودند و افسردگی در زنان (۹۵/۶ درصد) شایعتر از مردان (۵۲/۴ درصد) بود و شدت افسردگی نیز در زنان بیشتر بود. افسردگی در موارد مزمن بیماری عروق کرونر (۷۳/۶ درصد) بیشتر از موارد حاد (۴۷/۹ درصد) بود که شدت آن نیز در موارد مزمن بیشتر بود. بیشترین فراوانی افسردگی در گروه سنی بیشتر از ۶۰ سال بود. افسردگی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار ۶۶/۶ درصد و انفارکتوس میوکارد ۴۵/۸ درصد بود. از نظر نوع بیماری زمینه‌ای فراوانی افسردگی به ترتیب در افزایش فشار خون ۷۵ درصد، دیابت ۷۲/۷ درصد و چربی خون بالا ۵۹ درصد بود. از لحاظ میزان تحصیلات افسردگی در بیماران بی‌سواد ۹۰ درصد و در بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی ۳۶/۸ درصد بود.