

نشانه‌های بالینی و درمان آسیب‌های با عروس‌های دریایی خلیج فارس

*دکتر ایرج نبی پور^۱ (MD)

دستگاه گوارش، نارسایی قلبی عروقی، دیسترس تنفسی و حالت گیجی برخاسته از مسمومیت می‌باشد. جهت درمان نخست می‌بایست نماتوسیت‌ها را فعال کرد که این کار را می‌توان با استفاده از سرکه تجارتي، اسید استیک ۳ تا درصد برای ده دقیقه یا ترکیب جوش شیرین با آب و حتی ادرار انجام داد. کرم‌های استروئیدی موضعی و بی‌حس کننده‌ها، برای تسکین درد و تورم مفید هستند. گاهی مصرف ضد هیستامین‌های خوراکی و نارکوتیک‌ها برای کنترل درد لازم می‌باشند. تجویز آنتی بیوتیک‌ها برای ضایعات و زیکولر باید مدّ نظر قرار داد.

بحث و نتیجه‌گیری: عروس‌های دریایی از شایع‌ترین جانوران زهرآگین در خلیج فارس می‌باشند که با آریتم پوستی همراه با خارش تظاهر نموده و غیر فعال کردن نماتوسیت‌های آن‌ها اساس درمان می‌باشد.

واژگان کلیدی: خلیج فارس، عروس دریایی، آسیب‌ها، درمان

مقدمه: عروس‌های دریایی، شکل مدوز کلاس کاوتنان هستند که از اندازه‌ی ۲۲ سانتی متر تا ۲/۵ متر در سطح دریاها و اقیانوس‌ها شناورند و زندگی پلانکتونیک دارند. در اکتودرم تانتاکول و بازوهای دهانی عروس دریایی، نماتوسیت‌ها که کپسول‌های خاردار هستند قرار دارند.

روش شناسی: معرفی ۲۲ مورد بالینی از خلیج فارس و بررسی متون **یافته‌ها:** یافته‌های بالینی از یک خارش خفیف موضعی تا واکنش‌های کشنده‌ی شدید عمومی متغیر می‌باشند. نشانه‌های موضعی از یک حس خراش دهنده یا نیش زنده که بلافاصله پس از تماس روی می‌دهد تا حس سوختن یا درد ضربانی، در نوسان است. شدت نشانه‌ها طی ده دقیقه و یا همین حدود افزایش یافته و در منطقه‌ی التهاب یافته‌ی قرمز رنگ، تاول و یا حتی در موارد شدید، زخم نکروتیک، ایجاد می‌شود. درد ممکن است به صورت مرکزی گسترش یافته و با لنف آدنوپاتی و درد شکم و درد قفسه‌ی سینه توأم شود. علائم عمومی شامل تب، افزایش ترشحات، بیماری‌های